



Composition:

Each vial contains Ceftiofur sodium equivalent to Ceftiofur 1 gm.

Reconstitution of the sterile powder:

Cefgard vet Sterile powder should be reconstituted as follows:

1 gm vial- Reconstitute with 20 ml Sterile water for injection (supplied in pack). Each ml of the resulting solution contains Ceftiofur Sodium Equivalent to 50 mg Ceftiofur. Shake thoroughly prior to use.

Indication:

Cattle, Sheep & Goat:

Cefgard vet is indicated for the treatment of respiratory disease, shipping fever, pneumonia associated with *pasteurella haemolytica*, *pasteurella multocida* and *haemophilus somnus*. **Cefgard vet**. Also indicated for treatment of acute bovine interdigital necrobacillosis (foot rot, pododermatitis) associated with *fusobacterium necrophorum*.

Day old chicks & turkey:

Cefgard vet Is indicated for the control of early mortality, associated with *E. coli* organisms susceptible to ceftiofur, in day-old chicks.

Dosage & Administration:

Cefgard vet can be use Intramuscularly in cattle and Subcutaneously in day old chicks.

Cattle, Sheep & Goat:

1.1 - 2.2 mg/kg body weight or 1 - 2 ml reconstituted sterile solution per 45 kg body weight. Treatment should be repeated at 24 hour intervals for a total of 3 consecutive days. May also be used on days 4 and 5 for animals that do not show a satisfactory response (recovery) after the initial 3 treatments.

Day-old Chicks:

0.08-0.20 mg Ceftiofur/Chick. One ml of the 50 mg/ml reconstituted solution will treat approximately 250-625 day-old chicks.

Contraindications:

As with all drugs, the use of ceftiofur sodium sterile powder is contraindicated in animals previously found to be hypersensitive to the drug.

Side effects:

Use of ceftiofur may result in some signs of immediate and transient local pain to the animal.

Use in pregnancy & lactation:

The effects of ceftiofur on the reproductive performance, pregnancy and lactation of cattle, swine, sheep and goats have not been determined.

Storage:

Store in a cool and dry place, protected from light and moisture. Keep all medicines out of the reach of children.

For Veterinary Use Only

Supply:

1 gm vial with 20 ml sterile water for injection in two 10 ml ampoule.



Manufactured by : **Navana Pharmaceuticals Ltd.**
Rupshi, Rupgonj, Narayanganj, for
Guardian Healthcare Ltd.
Vet Life Division
Ashulia, Dhaka, Bangladesh.



উপাদান:

প্রতিটি ভায়ালে আছে সেফটিওফার সোডিয়াম যা ১ গ্রাম সেফটিওফার এর সমতুল্য ।

সন্ধান তৈরীর নিয়ম: সেফগার্ড ভেট নিম্নলিখিত ভাবে তৈরী হয়: ইনজেকশন এর জন্য ১ গ্রাম ভায়াল ২০ মিলি সরবরাহকৃত স্টেরাইল পানি দ্বারা মিশাতে হবে । তৈরী দ্রবনের প্রতি মিলিতে রয়েছে সেফটিওফার সোডিয়াম যা ৫০ মিগ্রা সেফটিওফার এর সমতুল্য । ব্যবহারের পূর্বে ভালভাবে ঝাকিয়ে নিতে হবে ।

নির্দেশনা:

গবাদিপ্রাণি, ভেড়া ও ছাগল: গবাদিপ্রাণির শ্বাসতন্ত্রের রোগ, শিপিং ফিভার, পাস্তুরেলা হেমোলাইটিকা, পাস্তুরেলা মাল্টোসিডা এবং হেমোফিলাস সোমনাস দ্বারা সৃষ্ট নিউমোনিয়ায় সেফগার্ড ভেট নির্দেশিত । এছাড়াও ফুসোব্যাকটেরিয়াস নেকরোফোরাম দ্বারা সৃষ্ট ফুট রোট, পোডোডার্মাইটিস এর চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয় ।

এক দিন বয়সী মুরগীর বাচা:

ই.কোলাই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দ্রুত মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে সেফগার্ড ভেট নির্দেশিত ।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

সেফগার্ড ভেট গবাদিপ্রাণির ইন্ট্রামাসকুলার পথে এবং একদিনের বাচ্চার চামড়ার নীচে ব্যবহার করা যায় । ১.১-২.২ মিগ্রা/কেজি দৈনিক ওজন অথবা ১-২ মিলি প্রতি ৪৫ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য ২৪ ঘণ্টা পরপর তিন দিন । প্রয়োজনে প্রাণির জন্য চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনেও চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে ।

এক দিন বয়সী মুরগীর বাচা:

০.০৮-০.২০ মিগ্রা সেফটিওফার/মুরগীর বাচা । ১ মিলি তৈরীকৃত সেফগার্ড ভেট দিয়ে প্রায় ২৫০-৬২৫টি মুরগীর বাচ্চার চিকিৎসা করা যায় ।

প্রতিনির্দেশনা:

সেফটিওফার সোডিয়ামের প্রতি অতি সংবেদনশীল প্রাণিতে ব্যবহার করা উচিত নয় ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

সেফগার্ড ভেট ইনজেকশন ব্যবহারের ফলে ঐ স্থানে তাৎক্ষণিক ব্যথা অনুভূত হতে পারে ।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

প্রজনন, গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকারী গবাদিপ্রাণির ক্ষেত্রে সেফগার্ড ভেট এর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত নয় ।

সংরক্ষণ:

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও শীতল (৩০^o সে: তাপমাত্রার নীচে) স্থানে রাখুন ।

সকল ঔষধ শিশুর নাপালের বাহিরে রাখুন ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহার্য

সরবরাহ:

১ গ্রাম ভায়াল এবং ২০ মিলি ইনজেকশন তৈরীর পানি ১০ মিলির দুটি অ্যাম্পুলে ।



প্রস্তুতকারক:- নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ
রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ।

গার্ডিয়ান হেলথকেয়ার লিঃ -এর পক্ষে
ভেট লাইফ ডিভিশন
আশুলিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ ।