

Composition:

Each Bolus contains Promethazine Hydrochloride BP 150 mg

Indications:

Promigard is used in animals suffering from any kind of allergy. It is also concurrently used when animals are treated with any kind of antibiotic.

Dosage & Administration:

Cattle : 1 Bolus/100 kg body weight orally for daily Poultry : 1 Bolus / 5 litres of drinking water for two times daily

or as directed by the registered veterinary physician

Contraindications:

Animals hypersensitive to Promethazine

Side effect:

May cause drowsiness as other antihistaminic drugs

Storage:

Store $\bar{\mbox{\sc in}}$ a cool and dry place, protected from light and moisture.

Keep all medicines out of the reach of children.

For Veterinary Use Only

Supply:

20 x 2's Bolus in a box





উপাদানঃ

প্রতিটি বোলাসে আছে-প্রোমিথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি. ১৫০ মি.গ্রা.

নির্দেশনাঃ

প্রমিগার্ড প্রাণিদের যে কোন ধরনের এলার্জিতে নির্দেশিত। এটি যে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসার সময় সহ চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা এবং প্রয়োগবিধিঃ

গবাদি প্রাণি : ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১টি বোলাস প্রতিদিন । পোল্ট্রি : ৫ লিটার খাবার পানিতে ১টি বোলাস মিশিয়ে দিনে ২ বার দিতে হবে।

অথবা রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারী চিকিৎসকের পরামর্শ আনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতিনির্দেশনাঃ

প্রোমিথাজিনের প্রতি অতি সংবেদনশীল প্রাণিদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

অন্যান্য এন্টিহিস্টামিন ঔষধের মত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব আসতে পারে।

সংরক্ষণ:

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

শুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহার্য

সরবরাহঃ

প্রতি বাক্সে ২০ x ২ টি বোলাস

